


فیزیک ۱

- گزینه «۲» - مساحت قسمت هاشورخورده $\frac{1}{3}$ مساحت دایره است ($\pi = 3$):



$$\frac{120}{360} = \frac{1}{3} \Rightarrow S_{\text{هاشورخورده}} = \frac{1}{3} \times \pi \times (5 \text{ ft})^2 = \frac{2500}{3} \pi \text{ ft}^2$$

$$? \text{ m}^2 = \frac{2500\pi}{3} (\text{ft})^2 \times \frac{144 (\text{inch})^2}{1(\text{ft})^2} \times \frac{6/25 \text{ cm}^2}{1(\text{inch})^2} \times \frac{1 \text{ m}^2}{10^4 \text{ m}^2} = \frac{2500 \times 144 \times 6/25}{10^4} \text{ m}^2 = 225 \text{ m}^2$$

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - تبدیل یکاهای غیرمتريک) (دشوار)

- گزینه «۴» - برای راحتی همه اعداد را به یک واحد تبدیل می‌کنیم، در اینجا به cm^3 تبدیل می‌کنیم:

$$V_A = 500 \text{ mL} = 500 \text{ cm}^3$$

$$V_B = 5 \times 10^{-1} \times (10^{(-1)-(-2)})^3 = 5 \times 10^2 = 500 \text{ cm}^3$$

تا اینجا گزینه‌های «۲» و «۳» حذف می‌شوند.

$$V_C = 5 \times 10^{+31} \text{ pm}^3 = 5 \times 10^{+31} \times (10^{-12-(-2)})^3 = 5 \times 10^{+31} \times 10^{-30} \text{ cm}^3 = 5 \times 10 \text{ cm}^3 = 50 \text{ cm}^3$$

بنابراین:

$$V_C < V_B = V_A$$

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - تبدیل یکاهای حجم) (دشوار)

- گزینه «۴» - از آن جا که در استوانه سطح مقطع تغییری نمی‌کند، آهنگ تغییر حجم و آهنگ تغییر ارتفاع با هم برابرند، بنابراین:

$$\frac{20 \text{ cm}}{2 \text{ h}} = \frac{10 \frac{\text{cm}}{\text{h}} \rightarrow \frac{\text{pm}}{\text{cs}}}{3600 \times 100 = 36 \times 10^4} = \frac{10^{11}}{36 \times 10^4} = \frac{10^7}{36} = 2/78 \times 10^5 \frac{\text{pm}}{\text{cs}}$$

(منصوری) (اندازه‌گیری - آهنگ تغییر) (دشوار)

- گزینه «۳» - مساحت کره:

$$A = 4\pi r^2 = 4 \times 3 \times (6/4 \times 10^6 \text{ m})^2 = 4/92 \times 10^{14} \text{ m}^2$$

$$\text{هکتار} = 10^4 \text{ m}^2$$

$$\text{هکتار} = \frac{4/92 \times 10^{14}}{10^4} \approx 5 \times 10^{10} \text{ مساحت زمین}$$

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - تبدیل یکاهای غیرمتريک) (متوسط)

- گزینه «۱» - ابتدا همه تندی‌ها را بر حسب $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ می‌نویسیم:

$$V_A = \lambda \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$V_B = 18 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 18 \times \frac{10^3}{3600} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$V_C = 3 \times 10^3 \frac{\text{dm}}{\text{min}} = 3 \times 10^3 \times \frac{10^{-1}}{60} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

مالحظه می‌کنیم که دونده A از B و C زودتر به خط پایان می‌رسد. (منصوری) (اندازه‌گیری - تبدیل یکا) (متوسط)

- گزینه «۲» -

$$44 \times 10^{-2} \text{ km}^2 \times \frac{10^4 \text{ dam}^3}{1 \text{ km}^2} = 4400 \text{ dam}^3 = 4/4 \times 10^3$$


توجه کنید که گزینه «۴» نیز درست است، اما به صورت نماد علمی نمایش داده نشده است.

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - تبدیل یکای سطح) (آسان)

- گزینه «۴» - (منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - فیزیک داشن بنیادی) (آسان)

- گزینه «۲» - در مدل‌سازی از آثار کم‌اهمیت چشم‌پوشی می‌کنیم، نیروی شخص عامل حرکت است و نباید از آن چشم‌پوشی شود، نیروی وزن جعبه و اصطکاک نیز همواره مؤثر و بالاهمیت‌اند. البته از مقاومت هوا می‌توانیم چشم‌پوشی کنیم، ولی در گزینه «۴» از اصطکاک نباید صرف نظر کنیم، چون در چگونگی حرکت جعبه سهم مهمی دارد. (منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - مدل‌سازی) (متوسط)

- ۹- گزینه «۱» - پیشوند کیلو به معنای 1000 برابر می‌باشد (10^3 برابر)، بنابراین $101 \text{ kp}_a = 101000 \text{ pa} = 101 \times 10^5 \text{ pa}$ اعلام می‌شود. (منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - تبدیل یکا و نماد علمی) (آسان)
- ۱۰- گزینه «۱» - با توجه به شکل ابتدا محیط دایره عظیمه کره را به دست می‌آوریم:



$$C = 4 \times 10^7 \text{ m} = 40000 \text{ km}$$

اینک شعاع کره زمین را به دست می‌آوریم:

$$2\pi R = 40000 \text{ km} \Rightarrow 2 \times \pi \times R = 40000 \text{ km} \Rightarrow R = \frac{40000}{2\pi} \approx 6370 \text{ km}$$

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - تعریف یکای طول) (متوسط)

- ۱۱- گزینه «۲» - یکای همه جملات باید متر باشد:

$$E(m) \Rightarrow A^2 B^2 \equiv (m) \Rightarrow B^2 s^2 = m \Rightarrow B^2 = \frac{m}{s^2} \Rightarrow B = \frac{\sqrt{m}}{s}$$

$$2AD \equiv (m) \Rightarrow DS = m \Rightarrow D : \frac{m}{s}$$

ضریب ۲ در یکا تأثیری ندارد.

$$\frac{B}{D} = \frac{\frac{m^{\frac{1}{2}}}{s^2}}{\frac{m}{s}} = \frac{\frac{1}{m}}{m} = m^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{B}{D} = \frac{\frac{\sqrt{m}}{s}}{\frac{m}{s}} = \frac{\sqrt{m}}{m} = \frac{1}{\sqrt{m}}$$

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - سازگاری یکا) (دشوار)

- ۱۲- گزینه «۲» - می‌دانیم گنجایش یک ظرف حجم داخلی آن است و از حجم استوانه شعاع داخلی را به دست می‌آوریم:


$$V = A \times h = A \times 30 \text{ cm} \Rightarrow A = \pi r^2 = 150 \text{ cm}^2$$

$$r^2 = 50 \text{ cm}^2 \Rightarrow r = 5\sqrt{2} \text{ cm}$$

که همان شعاع داخلی است، با در اختیار داشتن ضخامت ظرف شعاع خارجی به دست می‌آید:

$$r_{\text{خارجی}} = 5\sqrt{2} + 1$$

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - اندازه‌گیری حجم و تبدیل یکا) (دشوار)



- ۱۳- گزینه «۴» - با توجه به آن که در تبدیلات زنجیره‌ای ضرایب تبدیل باید برابر ۱ باشند، پس گزینه‌های «۱» و «۲» نادرست هستند.

گزینه «۳» نادرست است، زیرا پاسخ نهایی را بر حسب $\frac{m}{s}$ اعلام کرده که با صورت تست همخوانی ندارد.

$$? \frac{\text{cm}}{\text{s}} = 10.8 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 3000 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - تبدیل زنجیره‌ای) (متوسط)

- ۱۴- گزینه «۳» - برای تعریف بسیاری از کمیت‌های فیزیکی به راحتی می‌توانیم یکاهای مختلف را با یکدیگر ترکیب کرد و نیازی به تعریف جداگانه تمام کمیت‌ها، نمی‌پاشد. در اصل بیشتر کمیت‌های فیزیکی با یک یا چند کمیت اصلی در ارتباط هستند.

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - کمیت‌های فرعی و اصلی) (آسان)

- ۱۵- گزینه «۴» - تنها کمیت فرعی حجم می‌باشد و سه کمیت دیگر یعنی شدت جریان، دما و جرم کمیت اصلی هستند.

(منصوری) (اندازه‌گیری - کمیت‌ها) (آسان)

- ۱۶- گزینه «۲» - یکای kg مربوط به کمیت جرم، یکای m مربوط به کمیت طول، یکای s مربوط به کمیت زمان است.

$$\frac{\text{kgm}^2}{\text{s}^2} = \text{می‌دانیم یکای فرعی J (ژول)}$$

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - دستگاه بین‌المللی یکاهای) (متوسط)

- ۱۷- گزینه «۳» - ابتدا سال نوری را بر حسب متر نوشتene و حاصل را بر 1AU تقسیم می‌کنیم:

$$1\text{Ly} = \frac{86400 \text{ s}}{1 \text{ day}} \times 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\frac{4/2\text{Ly}}{\text{AU}} = \frac{4/2 \times 365 \times 86400 \times 3 \times 10^8 \text{ m}}{1/50 \times 10^{11}} \approx 26490 \text{ AU}$$

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - تبدیل یکاهای نجومی) (متوسط)

- ۱۸- گزینه «۳» - این تست نیاز به تفسیر کامل تری در سال دوازدهم دارد، اما با توجه به مفاهیم مدل‌سازی می‌توانیم از ویژگی‌های ظاهری فنر صرف‌نظر کنیم و تنها به جرم جسم که حرکتش را بررسی می‌کنیم بپردازیم. (منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - مدل‌سازی) (متوسط)

- ۱۹- گزینه «۳» - با توجه به تساوی می‌دانیم هر لیتر 1000 cm^3 است که به جای $1000 \text{ می‌توانیم از پیشوند k}$ (کیلو) استفاده کنیم. همچنین پیشوند M به معنای 10^6 است که در طرف راست برای ساخته شدن باید $= 10^6 = 10^{-3} \times 10^9$ شود که به جای 10^9 می‌توانیم از پیشوند G گیگا استفاده کنیم. (منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - پیشوند یکاهای) (متوسط)

- ۲۰- گزینه «۱» -

$$12 \times 2 / 5 = 24 / 5 = 4.8 \text{ cm} = 0.048 \text{ m}$$

$$3300 \times 0.048 = 158.4 \text{ m}$$

(منصوری) (فیزیک و اندازه‌گیری - تبدیل یکاهای) (آسان)