

ریاضی ۱

- گزینه «۱» - بررسی گزینه‌ها:

$$\text{«۱»: } 3x + 1 = -16 \Rightarrow 3x = -17 \Rightarrow x = -\frac{17}{3} \notin \mathbb{Z}$$

$$\text{«۲»: } 3x + 1 = -26 \Rightarrow 3x = -27 \Rightarrow x = -9 \in \mathbb{Z}$$

$$\text{«۳»: } 3x + 1 = -56 \Rightarrow 3x = -57 \Rightarrow x = -19 \in \mathbb{Z}$$

$$\text{«۴»: } 3x + 1 = -86 \Rightarrow 3x = -87 \Rightarrow x = -29 \in \mathbb{Z}$$

(طلوعی) (فصل اول - درس ۱ - مجموعه‌های متناهی و نامتناهی) (متوسط)

- گزینه «۳» -

$$\begin{aligned} -i+1 \leq 2 &\Rightarrow -i \leq 1 \Rightarrow i \geq -1 \xrightarrow{\cap} i > 3 \\ 2 < 3i - 7 &\Rightarrow 3i > 9 \Rightarrow i > 3 \end{aligned}$$

(طلوعی) (فصل اول - درس ۲ - بازه) (آسان)

- گزینه «۳» -

$$A \cap B' = (A \cap B)' \Rightarrow A - B = U - (A \cap B) \Rightarrow A - (A \cap B) = U - (A \cap B) \Rightarrow A = U \Rightarrow B \subset A \Rightarrow A' \subseteq B'$$

(طلوعی) (فصل اول - درس ۲ - متمم یک مجموعه) (دشوار)

- گزینه «۴» - بررسی گزینه‌ها:

$$\text{«۱»: } \mathbb{N} - E = \{1, 2, \dots\} - \{2, 4, 6, \dots\} = \{1, 3, 5, \dots\}$$

$$\text{«۲»: } \mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} - \{1, 2, 3, \dots\} = \{\dots, -2, -1, 0\}$$

$$\text{«۳»: } E - O = \{2, 4, 6, \dots\} - \{1, 3, 5, \dots\} = \{2, 4, 6, \dots\}$$

$$\text{«۴»: } W - \mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \dots\} - \{\dots, -1, 0, 1, \dots\} = \{\}$$

(طلوعی) (فصل اول - درس ۱ - مجموعه‌های متناهی و نامتناهی) (متوسط)

- گزینه «۱» -

$$-7 < 2x + 5 < 11 \Rightarrow -12 < 2x < 6 \Rightarrow -6 < x < 3 \xrightarrow{x \in \mathbb{N}} A = \{1, 2\}$$

$$B = (1, +\infty)$$

$$2 < 3x - 1 < 8 \Rightarrow 3 < 3x < 9 \Rightarrow C = (1, 3)$$

$$A - B = \{1\} \Rightarrow (A - B) \cup C = [1, 3]$$

(طلوعی) (فصل اول - درس ۲ - متمم یک مجموعه) (متوسط)

- گزینه «۲» - مجموعه $B - A$ شامل اعدادی است که مضارب ۶ باشند و مضرب ۴ نباشند و از طرفی دو رقمی طبیعی نیز باشند:

$$A - B = \{18, 30, 42, 54, 66, 78, 90\} \Rightarrow n(A - B) = 7$$

(طلوعی) (فصل اول - درس ۲ - متمم یک مجموعه) (متوسط)

- گزینه «۲» - بدیهی است که باید $n(A \cap B)$ و $n(A \cup B)$ نامنفی باشند، بنابراین داریم:

$$\begin{cases} 4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 4 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2 & (1) \\ x \geq 0 & (2) \\ 2x \geq 0 \Rightarrow x \geq 0 & (3) \end{cases}$$

$$(1), (2), (3) \xrightarrow{\text{اشتراک}} 0 \leq x \leq 2 \xrightarrow{x \in \mathbb{Z}} x = 0, 1, 2$$

$$x = 0 \Rightarrow n(A) = 4, n(B) = 0, n(A \cap B) = 0 \Rightarrow n(A \cup B) = 4 + 0 - 0 = 4$$

$$x = 1 \Rightarrow n(A) = 3, n(B) = 2, n(A \cap B) = 1 \Rightarrow n(A \cup B) = 3 + 2 - 1 = 4$$

این حالت غیرقابل قبول است.

زیرا باید $n(A \cap B) \leq n(A)$ و $n(A \cap B) \leq n(B)$ باشد، پس $n(A \cup B) \leq n(A)$ فقط می‌تواند برابر ۴ باشد.

(طلوعی) (فصل اول - درس ۲ - بازه‌ها) (دشوار)

- گزینه «۲» - ۸

$$n(U) = 20.$$

$$3: \text{مضرب } A = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\} \Rightarrow n(A) = 6$$

$$5: \text{مضرب } B = \{5, 10, 15, 20\} \Rightarrow n(B) = 4$$

$$A \cup B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 5, 10, 20\} \Rightarrow n(A \cup B) = 9$$

$$n(A' \cap B') = n(A \cup B)' = n(U) - n(A \cup B) = 20 - 9 = 11$$

(کتاب همراه علوفی) (فصل اول - درس ۲ - متمم یک مجموعه) (دشوار)

- گزینه «۳» - ۹

$$A - B = A \cap B' \Rightarrow (A \cap B')' = A' \cup B \quad (I)$$

از طرفی داریم:

$$((A' \cup B) \cup X)' = ((A' \cup B)' \cap X') \xrightarrow{(I)} (A \cap B') \cap X' \Rightarrow (A - B) \cap X' = \emptyset$$

باید امتحان کنیم اشتراک متمم کدام گزینه با $A - B$ برابر \emptyset خواهد شد. بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: $(A - B) \cap A = A - B$

گزینه «۲»: $(A - B) \cap B' = A - B$

گزینه «۳»: $(A - B) \cap A' = \emptyset$

گزینه «۴»: $(A - B) \cap (B - A)' = A - B$ (طلوعی) (فصل اول - درس ۲ - متمم یک مجموعه) (دشوار)

- گزینه «۲» - چند جمله از این دنباله را به دست می‌آوریم:

$$t_1 = \frac{1-2}{3+1} = -\frac{1}{4}, t_2 = \frac{2-2}{3 \times 2+1} = 0$$

و از $n = 3$ به بعد صورت، عددی مثبت می‌شود.

$$t_3 = \frac{3-2}{3 \times 3+1} = \frac{1}{10}$$

و حاصل تقسیم آن بر مخرج (که آن هم عددی مثبت است) مثبت خواهد شد، پس این دنباله فقط یک جمله منفی دارد.

(طلوعی) (فصل اول - درس ۳ - الگو و دنباله) (متوسط)

$$\begin{cases} a_1 = 4 \times a + b = -11 \Rightarrow 4a + b = -11 \\ a_{1+1} = a \times 1 + b = 7 \Rightarrow a + b = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4a - b = 11 \\ a + b = 7 \end{cases} \Rightarrow 5a = 18 \Rightarrow a = 2, b = -22$$

$$\Rightarrow a_n = 2n - 22 \Rightarrow a_n = 19 \Rightarrow 2n - 22 = 19 \Rightarrow n = 14$$

(طیوعی) (فصل اول - درس ۴ - دنباله حسابی) (متوسط)

۱۲- گزینه «۴» - نشان می‌دهد که هر جمله از ضرب شدن $\frac{1}{3}$ در جمله قبل از آن به دست آمده و این یعنی یک دنباله هندسی با

قدر نسبت $\frac{1}{3}$. از طرفی جمله اول برابر ۳ است، پس:

$$t_n = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \Rightarrow t_n = 3 \times \frac{1}{3^{n-1}} = \frac{3}{3^{n-1}}$$

(طیوعی) (فصل اول - درس ۴ - دنباله‌های هندسی) (متوسط)

۱۳- گزینه «۴» - جمله اول ۱۱ است و قدر نسبت دنباله برابر با اختلاف دو جمله متوالی یعنی ۵ است:

$$t_n = t_1 + (n-1)d = -11 + (n-1) \times 5 = -11 + 5n - 5 \Rightarrow t_n = 5n - 16$$

(طیوعی) (فصل اول - درس ۴ - دنباله حسابی) (آسان)

۱۴- گزینه «۲» - اولین شکل ۳ چوب‌کبریت دارد و در الگو، هر شکل ۲ چوب‌کبریت بیشتر از شکل قبل دارد، بنابراین شکل n به

تعداد $3 + (n-1) \times 2$ چوب‌کبریت خواهد داشت:

$$n = 17 \Rightarrow 3 + (17-1) \times 2 = 3 + 16 \times 2 = 3 + 32 = 35$$

(طیوعی) (فصل اول - درس ۳ - الگو و دنباله) (متوسط)

۱۵- گزینه «۴» - جملات t_1, t_2, t_5 و t_7 از دنباله حسابی، جملات دنباله هندسی هستند، بنابراین:

$$t_5^2 = t_1 \times t_{12} \Rightarrow (t_1 + 4d)^2 = (t_1 + d)(t_1 + 11d) \Rightarrow t_1^2 + 8t_1d + 16d^2 = t_1^2 + 12t_1d + 11d^2 \Rightarrow 5d^2 - 4t_1d = 0 \Rightarrow \begin{cases} d = 0 \\ 5d = 4t_1 \Rightarrow t_1 = \frac{5}{4}d \end{cases}$$

پس جملات دنباله حسابی طبق جمله عمومی برابرند با:

$$t_1 + d, t_1 + 4d, t_1 + 11d \xrightarrow{t_1 = \frac{5}{4}d} \frac{9}{4}d, \frac{21}{4}d, \frac{49}{4}d \Rightarrow r = \frac{\frac{21}{4}d}{\frac{9}{4}d} = \frac{7}{3}$$

(کتاب همراه علوفی) (فصل اول - درس ۴ - دنباله‌های حسابی و هندسی) (دشوار)

۱۶- گزینه «۳» -

$$a_n = 2 \Rightarrow \frac{2n^2 + 5n + 2}{n^2 + 16} = 2 \Rightarrow 2n^2 + 5n + 2 = 2n^2 + 32 \Rightarrow 5n = 32 - 2 = 30 \Rightarrow n = \frac{30}{5} = 6$$

(طیوعی) (فصل اول - درس ۳ - الگو و دنباله) (آسان)

۱۷- گزینه «۴» -

$$\begin{aligned} a_1 \cdot a_1 q^9 &\Rightarrow \frac{a_1}{a_6} = \frac{a_1 q^9}{a_1 q^5} = q^4 = 256 \Rightarrow q = 4 \\ a_6 &= a_1 q^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_1 &= a_1 q^r \Rightarrow a_1 q^r = 512 \xrightarrow{q=4} a_1 = \pm \sqrt[4]{2} \Rightarrow a_1 = \sqrt[4]{2} \\ a_r &= a_1 q^r \end{aligned}$$

$$a_r = a_1 \cdot 4^r = 64 a_1 = 64 \sqrt[4]{2}$$

(طیوعی) (فصل اول - درس ۴ - دنباله‌های هندسی) (متوسط)

-۱۸- گزینه «۳» - قیمت کالا را x در نظر می‌گیریم که قرار است هر سال 10% به آن افزوده شود:

$$x + \frac{10}{100}x = 1/1x$$

پس در هر سال قیمت‌ها در $1/1$ ضرب می‌شوند، به عبارت دیگر یک دنباله هندسی با قدر نسبت $1/1$ می‌سازند و داریم:

$$\frac{a_5}{a_1} = \frac{a_1 r^4}{a_1} = r^4 = (1/1)^4 = 1/4641$$

(سراسری) (فصل اول - درس ۴ - دنباله هندسی) (دشوار)

-۱۹- گزینه «۱» - دنباله ارتفاع‌های توب از زمین، یک دنباله هندسی است با $t_1 = 40$ و $r = \frac{1}{5}$ ، بنابراین جمله پنجم این دنباله $\frac{40}{5^2}$ است.

$40, 20, 10, 5, 2/5, \dots$

(طلوعی) (فصل اول - درس ۴ - دنباله هندسی) (متوسط)

- گزینه «۴» - ۲۰

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 60 \Rightarrow 5a_1 + 4d = 60 \Rightarrow a_1 + 4d = 12$$

$$a_2 + a_5 = 3(a_1 + a_2 + a_3) \Rightarrow 2a_1 + 7d = 3(3a_1 + 2d) \Rightarrow 2a_1 + 7d = 9a_1 + 6d \Rightarrow 7a_1 + d = 0$$

$$\begin{cases} a_1 + 4d = 12 \\ 7a_1 + d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -7a_1 - 14d = -84 \\ 7a_1 + d = 0 \end{cases} \Rightarrow -13d = -84 \Rightarrow d = 6$$

(طلوعی) (فصل اول - درس ۴ - دنباله‌های حسابی) (متوسط)