

## شیمی

۱- گزینه «۳» - شکل، تشکیل پیوند یونی در اثر داد و ستد الکترون میان عنصر کلسیم (Ca<sub>۲</sub>) و کلر (Cl<sub>۱۷</sub>) را نشان می‌دهد.  
در کلسیم کلرید (CaCl<sub>۲</sub>) که ترکیب یونی دوتایی نامیده می‌شود، تعداد کاتیون Ca<sup>۲+</sup> یک عدد و تعداد آئیون (Cl<sup>-</sup>) دو عدد است، پس نسبت شمار کاتیون‌ها به آئیون‌ها در آن ۱ به ۲ است (عبارت «ب» نادرست است).

۲. Ca : [Ar] / ۴s<sup>۲</sup> → Ca<sup>۲+</sup> : [Ar] ⇒ ۱۸ الکترونی می‌شود ۱۸

۱۷ Cl : [Ne] / ۲s<sup>۲</sup> ۳p<sup>۵</sup> → Cl<sup>-</sup> : [Ar] ⇒ ۱۸ الکترونی می‌شود.

یون Ca<sup>۲+</sup> و Cl<sup>-</sup> تعداد الکترون برابر دارند (هر دو ۱۸ الکترونی شده‌اند) و هم الکترون هستند، ضمناً هر دو به آرایش یک گاز نجیب رسیده‌اند [Ar]. (دکتر نامور) (پایه دهم - فصل اول - تبدیل اتم‌ها به یون‌ها) (آسان)

۲- گزینه «۳» - بررسی گزینه نادرست:

با توجه به آرایش الکترونی کامل As<sub>۳۳</sub>، در این عنصر ۷ زیرلایه از الکترون پر شده و ۸ زیرلایه از الکترون اشغال شده است.

۳۳ As : ۱s<sup>۲</sup> / ۲s<sup>۲</sup> ۲p<sup>۶</sup> / ۳s<sup>۲</sup> ۳p<sup>۶</sup> ۳d<sup>۱۰</sup> / ۴s<sup>۲</sup> ۴p<sup>۳</sup>  
۷ زیرلایه از ۶ پر شده

(دکتر نامور) (پایه دهم - فصل اول - ساختار اتم و رفتار آن) (آسان)

۳- گزینه «۱» -

MgO: منیزیم اکسید (اکسید فلزی)	Cu <sub>۲</sub> S: مس (I) سولفید
ZnO: روی اکسید (اکسید فلزی)	SO <sub>۳</sub> : گوگرد تری اکسید (اکسید فلزی)
CaO: کلسیم (II) اکسید (اکسید فلزی)	CrO: کروم (III) اکسید (اکسید فلزی)
FeF <sub>۳</sub> : آهن (III) فلورید	NO <sub>۲</sub> : نیتروژن دی اکسید (اکسید نافلزی)

در سه ترکیب FeF<sub>۳</sub>، Cu<sub>۲</sub>S و CrO عدد بار الکتریکی کاتیون بعد از نام فلزی در نامگذاری نوشته می‌شود، چون فلز آن‌ها کاتیون‌هایی با بارهای الکتریکی متفاوتی دارد. (دکتر نامور) (پایه دهم - فصل دوم - ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها) (آسان)

۴- گزینه «۳» -

نام ترکیب	فمول شیمیایی	نوع پیوند	ترکیب یونی	جرم مولی
پتاسیم نیترید	K <sub>۲</sub> N	یونی	هست	۱۳۱
هیدروژن کلرید	HCl	اشتراکی	نیست	۳۶/۵
سدیم سولفید	Na <sub>۲</sub> S	یونی	هست	۷۸
منیزیم برمید	MgBr <sub>۲</sub>	یونی	هست	۱۸۴
کربن دی اکسید	CO <sub>۲</sub>	اشتراکی	نیست	۴۴
آلومینیوم اکسید	Al <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	یونی	هست	۱۰۲

در بین ترکیب‌های داده شده، ۴ مورد ترکیب یونی هستند و بین آن‌ها در ۳ مورد جرم مولی درست داده شده است.

(دکتر نامور) (پایه دهم - فصل اول - ترکیب یونی و جرم مولی) (متوسط)

۵- گزینه «۳» - هر عنصر، طیف نشری خطی ویژه خود را دارد و مانند اثر انگشت ما، می‌توان از آن طیف برای شناسایی عنصر استفاده کرد. در اینجا از مقایسه طیف نشری خطی فلز مس و جیوه، با نمونه سفال مشخص می‌شود از نظر تعداد خطوط و فاصله خطها در طیف نشری خطی فلز مس و جیوه، کاملاً با الگوی نمونه داده شده مطابقت دارد، پس در این نمونه ظرف سفال فلزهای مس و جیوه وجود داشته‌اند.

(دکتر نامور) (پایه دهم - فصل اول - نشر نور) (متوسط)

۶- گزینه «۱» - کلیه عبارت‌های ذکر شده در مورد هواکره و اجزای سازنده آن درست هستند. (دکتر نامور) (پایه دهم - فصل دوم - لایه‌های هواکره) (آسان)

۷- گزینه «۲» - فقط موارد (ت) و (ث) درست هستند. بررسی عبارت‌های نادرست:

(آ) کربن دی اکسید (CO<sub>۲</sub>) عنصر نیست و ترکیب می‌باشد.

(ب) از انبیق برای گرم کردن مخلوطها و هدایت بخارهای حاصل استفاده می‌شود.

(پ) خنک کردن قطعات الکترونیکی مانند MRI از کاربردهای هلیم است.

در عبارت (ث) گاز طبیعی (ذکر شده که از منابع زمینی هلیم و هواکره مناسب‌تر است).

توجه: منابع زمینی هلیم از هواکره، سرشارتر و برای تولید هلیم در مقیاس صنعتی مناسب‌ترند.

(دکتر نامور) (پایه دهم - فصل دوم - تقطیر جزء به جزء هوای مایع) (متوسط)

- ۸- گزینه «۲» - در نمونه‌ای از هوا مایع با دمای  $C = -200^{\circ}$ ، مخلوطی از چند مایع شامل نیتروژن، آرگون و اکسیژن وجود دارد و در این نمونه گازهای هلیم، کربن‌دی‌اکسید و رطوبت وجود ندارد، پس در قسمت اول سؤال، هر چهار گزینه می‌تواند درست باشد.

قسمت دوم:

$$T = \theta + 273 \Rightarrow 88k = \theta + 273 \Rightarrow \theta = -185^{\circ}C$$

ابتدا دمای داده شده را به سلسیوس تبدیل می‌کنیم. با توجه به این‌که دمای جوش آرگون  $C = -186^{\circ}$  است، پس در دمای  $C = -185^{\circ}$  در تقطیر جزء به جزء هوا مایع با دمای  $C = -200^{\circ}$ ، گاز آرگون جدا می‌شود. (دکتر نامور) (پایه دهم - فصل دوم - تقطیر جزء به جزء هوا مایع) (متوسط)

- ۹- گزینه «۲» - ساختار لوویس ترکیب داده شده به صورت  $\begin{array}{c} \ddot{S} \\ || \\ O \\ \backslash \quad / \\ :O: \end{array}$  است کاملاً شبیه به ساختار لوویس گوگرد دی اکسید  $SO_2$  است. که در آرایش الکترون نقطه‌ای اتم مرکزی  $S$  یا  $X$ ، شش الکترون وجود دارد و متعلق به گروه ۱۶ جدول تناوبی است ( $\ddot{S}:$ ). با توجه به فرمول زیر می‌توان شماره گروه عنصر  $Y$  را بدست آورد.




مجموع الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی - مجموع الکترون‌های لایه ظرفیت اتم‌ها (مجموع شماره گروه‌های اصلی) = بار الکتریکی یون

$$\begin{array}{ccccccccc} -1 & = & [(4 \times 6) + (1 \times y)] - [(4 \times 2) + (12 \times 2)] & & & & & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & \text{شماره گروه های } y & & \text{تعداد جفت e} & & \text{ناپیوندی} & & \\ & & & & & & & & \\ -1 & = & 24 + y - 32 & \Rightarrow & y = 7 & \Rightarrow & 17 & = & y \end{array}$$

(دکتر نامور) (پایه دهم - فصل دوم - ساختار لوویس) (متوسط)

- ۱۰- گزینه «۴»

$\frac{\text{شمار جفت الکترون ناپیوندی}}{\text{شمار جفت الکترون پیوندی}}$  نسبت



(دکتر نامور) (پایه دهم - فصل دوم - ساختار لوویس) (متوسط)

- ۱۱- گزینه «۲» - با توجه به شکل‌های مدل فضایبرکن مولکول‌ها در صفحه‌های ۴۱ و ۵۵ کتاب درسی شکل  $NH_3$  به صورت



و شکل

سه ضلعی مسطح مربوط به  $SO_3$  است. (دکتر نامور) (پایه دهم - فصل اول و دوم - مدل فضایبرکن) (متوسط)

- ۱۲- گزینه «۲» - بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) چنان‌چه نمودار فشار گاز اکسیژن بر حسب ارتفاع از سطح زمین را رسم کنیم (صفحه ۵۲ کتاب درسی شیمی ۱)، مشخص می‌شود با افزایش ارتفاع، فشار گاز اکسیژن با شبیه کند و ملایمی کاهش می‌یابد.

پ) در طبیعت فلز آلومینیم به شکل بوکسیت  $Al_2O_3$  (به همراه ناخالصی) و سیلیسیم به شکل سیلیسیس ( $SiO_2$ ) وجود دارد. (دکتر نامور) (پایه دهم - فصل دوم - اکسیژن گازی واکنش‌پذیر) (آسان)

- ۱۳- گزینه «۴» - روغن زیتون به فرمول  $C_{57}H_{104}O_6$ ، هیدروکربن نیست و ترکیب آلی اکسیژن دار می‌باشد.

(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - انحلال‌پذیری مولکول‌های قطبی و ناقطبی) (آسان)

- ۱۴- گزینه «۳» - بررسی عبارت‌های نادرست:

آ) شربت معده، سوسپانسیون ولی شیر کلوئید است و هر دو ناهمگن هستند.

پ) پخش کردن نور و ناهمگن بودن از ویژگی‌های کلوئیدها است، ولی کلوئیدها پایدار هستند و تهشیش نمی‌شوند.

(سراسری ریاضی - ۱۴۰۰) (پایه دوازدهم - فصل اول - مقایسه محلول، کلوئید و سوسپانسیون) (آسان)

۱۵- گزینه «۲» - ترکیب‌های بازی:  $\text{Li}_2\text{O}$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{NH}_3$  و  $\text{NaOH}$  هستند که پس از حل شدن در آب، یون  $\text{OH}^-$  پدید می‌آید. ترکیب‌های اسیدی  $\text{CO}_2$  و  $\text{SO}_3$  هستند که در آب یون  $\text{H}_3\text{O}^+$  تولید می‌کنند.

ترکیب‌هایی که نه خاصیت اسیدی و نه خاصیت بازی دارند:  $\text{NaCl}$  (نمک) و  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  (الکل) هستند. (دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - مواد اسیدی و بازی) (آسان)

۱۶- گزینه «۴» - ابتدا فرمول شیمیایی هر دو پاک‌کننده را می‌نویسیم:



پاک‌کننده صابونی:  $\text{C}_{18}\text{H}_{35}\text{O}_2\text{Na}$   
سپس بخش‌های مشابه را از دو ترکیب حذف و ساده می‌کنیم:



بخش اضافی پاک‌کننده صابونی، ۴ اتم H است:

$$4 \times 1 = 4$$

بخش اضافی پاک‌کننده غیرصابونی، ۱۱ اتم C، ۱۱ اتم S و ۱۱ اتم O است:

$$(1 \times 12) + (1 \times 32) + (1 \times 16) = 60$$

$$60 - 4 = 56$$

سپس تفاوت جرم مولی دو ترکیب ۵۶ است. (دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - پاک‌کننده‌های غیرصابونی ترکیبی را جرم مولی) (متوسط)

۱۷- گزینه «۳» - بررسی عبارت‌های نادرست:

(ب) آمونیاک،  $\text{NH}_3$  یک باز آرینوس است که در ساختار خود یون هیدروکسید ( $\text{OH}^-$ ) ندارد و پس از انحلال در آب، یون  $\text{OH}^-$  پدید آورد.

(ث) سولفوریک اسید،  $\text{H}_2\text{SO}_4$  یک اسید دو پروتون دار است و هر یک مول آن به تقریب با ۲ مول سدیم هیدروکسید  $\text{NaOH}$  خنثی می‌شود و هر نیم مول آن با ۱ مول  $\text{NaOH}$  خنثی می‌شود. (دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - اسیدها و بازها) (آسان)

۱۸- گزینه «۱» - بررسی عبارت‌های نادرست:


(ب) رسوب  $\text{RCOO}_2\text{Mg}$  (ایجاد می‌شود).

(پ)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}^-\text{Na}^+$  پاک‌کننده نیست، زیرا بخش هیدروکربنی (آلکیل) آن، بلند نیست.


(ت) رسوب دادن نمک‌های  $\text{Mg}^{2+}$  و  $\text{Ca}^{2+}$ ، وظیفه نمک‌های فسفات است نه صابون آنزیم‌دار.

(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - پاک‌کننده‌ها) (آسان)

۱۹- گزینه «۱» - معادله واکنش سوختن اسید چرب در حالت کلی به صورت زیر است:



روش حل: با تناسب



$$13/5\text{ g} \quad 37/4\text{ g}$$

توجه: جرم مولی اسید چرب یک عاملی با زنجیره هیدروکربنی سیر شده ( $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ ) از رابطه  $M = 14n + 32$  به دست می‌آید:  
 $\Rightarrow 37/4 \times (14n + 32) = 13/5 \times (44n)$

$$523/6n + 1196/8 = 594n \Rightarrow 594n - 523/6n = 1196/8 \Rightarrow 70/4n = 1196/8 \Rightarrow n = 17$$

فرمول صابون جامد:



(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - مسائل صابون‌ها) (دشوار)

۲۰- گزینه «۲» - ابتدا شکل (O<sup>+</sup>) که نشان دهنده یون هیدرونیم (H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>) است را در سه شکل داده شده مقایسه می کنیم.

در محلول HA، ۲ تا و در محلول HB، ۴ تا و در محلول HC، یک یون هیدرونیم موجود است. پس با غلظت های یکسان، محلولی که یون هیدرونیم بیشتری دارد (یعنی HB) اسید قوی تری است و Ka بزرگ تری دارد و سرعت واکنش نوار منیزیم با آن نیز بیشتر است و رسانایی الکتریکی محلول آن بیش تر خواهد بود. بررسی عبارت های نادرست:

(ت)



ث) از ۴ مولکول اسید HA که در آب حل شده، ۲ مولکول یونش یافته و ۲ مولکول آن یونیزه شده، پس  $\alpha = 0.5$  است.

$$\alpha = \frac{2}{4} \times 100 = 50$$

(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - مقایسه اسیدهای قوی و ضعیف) (متوسط)

۲۱- گزینه «۲» - CH<sub>3</sub>COOH، استیک اسید، ترکیبی مولکولی و الکترولیت است. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH، اتانول، ترکیبی مولکولی و غیرالکترولیت است. BaO، باریم اکسید، ترکیبی یونی و الکترولیت است. SO<sub>3</sub>، گوگردتری اکسید، ترکیبی مولکولی و الکترولیت است.

(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - الکترولیت و غیرالکترولیت) (آسان)

۲۲- گزینه «۳» - هرچه غلظت یون ها (یون هیدرونیم و آنیون اسید) در محلول بیشتر باشد، رسانایی الکتریکی محلول بیشتر بوده و آمپرسنج عدد بزرگ تری را نشان می دهد (گزینه «۳») بررسی گزینه ها:

گزینه «۱»: HCl اسید قوی با ( $\alpha = 1$ ) است.

گزینه «۲»: HNO<sub>۳</sub> اسید قوی ( $\alpha = 1$ ) است.

گزینه «۳»: فورمیک اسید HCOOH، یک اسید ضعیف است ( $\alpha = 0.024$ ).

$$[H_3O^+] = M \cdot \alpha = 1 \times 10^{-4} \times 1 = 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$[H_3O^+] = M \cdot \alpha = 2 \times 10^{-4} \times 1 = 2 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$[H_3O^+] = M \cdot \alpha = 2 \times 10^{-1} \times 0.024 = 48 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$


گزینه «۴»: HCN اسید ضعیف است ( $\alpha = 0.014\%$ ).  $\therefore \alpha = \frac{0.014}{100}$

$$[H_3O^+] = M \cdot \alpha = 4 \times 10^{-2} \times \frac{0.014}{100} = 56 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - رسانایی الکتریکی محلول ها) (آسان)

۲۳- گزینه «۴» - از آنجایی که پس از یونش اسید HA، ۰/۹ مول اسید به صورت مولکولی HA حل شده و یونش نیافته و ۰/۰ مول H<sup>+</sup> تولید شده، یعنی ۰/۰ مول از اسید HA یونش یافته، پس مقدار اولیه اسید ۱ مول بوده است.

$$\alpha = \frac{\text{تعداد مول یونش یافته}}{\text{تعداد کل مول های حل شده}} = \frac{0.1}{1} = 0.1$$



$$[H^+] = [A^-] = M \cdot \alpha = \frac{\text{mol}}{L} \times \alpha = \frac{1 \text{ mol}}{0.5 \text{ L}} \times 0.1 = 0.2 \frac{\text{mol}}{L}$$

$$Ka = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} = \frac{\frac{0.1 \text{ mol}}{0.5 \text{ L}} \times \frac{0.1 \text{ mol}}{0.5 \text{ L}}}{\frac{0.9 \text{ mol}}{0.5 \text{ L}}} = 0.022$$

(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - محاسبه غلظت یون هیدرونیم و ثابت یونش اسیدی) (متوسط)

۲۴- گزینه «۲» - بررسی عبارت های نادرست:

آ) غلظت یون هیدرونیم در محلول (آ) که یک اسید قوی است بیش تر از محلول (ب) که اسید ضعیف است، می باشد.

ب) غلظت گونه مولکولی حل شده (اسید یونش نیافته) در محلول (ب) که اسید ضعیف است بیش تر می باشد.

ث) لامپ در مولد الکتریکی شامل محلول اتانول، خاموش است، زیرا محلول اتانول غیرالکترولیت است.

بررسی عبارت های درست:

پ) چون هر دو اسید، تک پروتون دار هستند، غلظت H<sup>+</sup> و آنیون اسید (X<sup>-</sup>) با هم برابر است.

ت) محلول (ب) می تواند HF هیدروفلوریک اسید باشد (دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - رسانایی محلول اسید قوی و ضعیف) (آسان)

- ۲۵ - گزینه «۲» - بررسی عبارت‌های نادرست:

ت) سرعت واکنش نوار منیزیم با هیدروکلریک اسید (HCl) بیش تر از واکنش با استیک اسید (CH<sub>۳</sub>COOH) است، زیرا HCl یک اسید قوی و استیک اسید یک اسید ضعیف است.

ث) برخی فلزها با محلول اسیدها واکنش می‌دهند و گاز هیدروژن آزاد می‌کنند. Cu, Ag, Pt, Hg و Au با HCl واکنش نمی‌دهند.

ج) چون هم HCl و هم CH<sub>۳</sub>COOH هر دو اسید تک پروتون دار هستند، با تمام شدن زمان واکنش حجم گاز هیدروژن آزاد شده با هم برابر است و از واکنش هر مول فلز منیزیم با هریک از این دو اسید، یک مول گاز H<sub>۲</sub> آزاد می‌شود.


(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - واکنش فلز با اسیدها) (متوسط)

- ۲۶ - گزینه «۳» -

هیدروسیانیک اسید (HCN)، یک اسید ضعیف است و غلظت یون هیدرونیم در محلول آن به درجه یونش اسید بستگی دارد.

(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - محاسبه غلظت یون هیدرونیم در محلول اسید ضعیف) (آسان)

- ۲۷ - گزینه «۴» -



از آنجایی که، استیک اسید، یک اسید تک پروتون دار است غلظت یون هیدرونیم در محلول با غلظت یون هیدرونیم محلول برابر است، زیرا ضریب این دو یون در معادله یونش اسید یکسان می‌باشد.

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{0.0006 \times 0.0006}{0.02} = \frac{36 \times 10^{-8}}{2 \times 10^{-2}} = 18 \times 10^{-6} = 1.8 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$K_a = \frac{M \cdot M}{M} = M \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ یا واحد}$$

(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - ثابت تعادل یونش اسید  $K_a$ ) (متوسط)

- ۲۸ - گزینه «۴» - بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: اسیدهای تک پروتون دار فقط یک اتم هیدروژن اسیدی در ساختار خود دارند. به عنوان مثال استیک اسید (CH<sub>۳</sub>COOH) در ساختار خود ۴ اتم هیدروژن دارد، ولی تنها اتم هیدروژن گروه کربوکسیل آن‌ها به صورت یون هیدرونیم وارد محلول می‌شود.

گزینه «۲»: در شرایط یکسان (از نظر دما و غلظت) غلظت یون‌ها (آنیون‌ها و کاتیون‌ها) در محلول HCl بیشتر از HF است.

گزینه «۳»: اسیدهای قوی و ضعیف را بر مبنای درجه یونش آن‌ها در آب تقسیم‌بندی می‌کنند.

(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - اسیدها و بازها) (آسان)

- ۲۹ - گزینه «۳» - این گزینه کاملاً درست است، زیرا HNO<sub>۳</sub> اسید قوی و دارای یونش کامل است و استیک اسید جزئی یونیده می‌شود. بررسی

سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: اکثر مولکول‌های استیک اسید یونیده شده است، در حالی که اکثر آن‌ها یونیده نشده می‌مانند.

گزینه «۲» HNO<sub>۳</sub> ضعیف در ظرف گرفته شده.

گزینه «۴»: HNO<sub>۳</sub> اسید ضعیف هستند. (دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - مقایسه اسید قوی و اسید ضعیف) (متوسط)


۳۰ - گزینه «۳» - ابتدا مقدار مول هر یک از یون‌ها در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب به دست می‌آوریم:

$$Mg^{2+} \text{ مول } n = \frac{m}{M} = \frac{60 \times 10^{-3} \text{ g}}{24} = 0.025 \text{ mol } Mg^{2+}$$

$$Ca^{2+} \text{ مول } n = \frac{m}{M} = \frac{200 \times 10^{-3} \text{ g}}{40} = 0.05 \text{ mol } Ca^{2+}$$

سپس مجموع مول این دو یون را حساب می‌کنیم و مقدار آن‌ها را در ۲ لیتر به دست می‌آوریم:

$$0.025 + 0.05 = 0.075 \text{ mol } X^{2+} \text{ در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب شهری}$$



$$\text{صابون } x = 0.15 \text{ mol}$$

واکنش را موازن کرده با تناسب حل می‌کنیم:

(دکتر نامور) (پایه دوازدهم - فصل اول - مسائله صابون‌ها) (متوسط)