

زیست‌شناسی ۱

۱- نمی‌توان گفت در بدن انسان آمونیاک

- (۱) حاصل تجزیه آمینواسیدها نمی‌باشد.
(۲) سمیت بسیار بیشتری نسبت به اوره دارد.
(۳) امکان انباشته شدن و دفع با فواصل زمانی را دارد.
(۴) در کلیه از طریق ترکیب با کربن‌دی‌اکسید به اوره تبدیل می‌شود.

۲- عدم ترشح هورمون ضد ادراری در بدن منجر به بیماری می‌شود و میزان ادرار می‌یابد.

- (۱) دیابت بی‌مزه - کاهش (۲) دیابت شیرین - افزایش (۳) دیابت بی‌مزه - افزایش (۴) دیابت شیرین - کاهش

۳- کدام عبارت در ارتباط با سامانه دفعی در جانداران مختلف صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) دفع مواد نیتروژن‌دار زائد در سخت‌پوستان با انتشار ساده از آبشش‌ها صورت می‌گیرد.
(۲) در بسیاری از تک‌یاخته‌ای‌ها تنظیم اسمزی با کمک انتشار صورت می‌گیرد.
(۳) نفریدی ساختاری برای دفع و تنظیم اسمزی در همه بی‌مهرگان می‌باشد.
(۴) پارامسی از طریق واکوئل انقباضی، آبی که بوسیله اسمز وارد می‌شود را به همراه مواد دفعی، دفع می‌کند.

۴- کدام یک از موارد زیر در مورد کلیه انسان صحیح می‌باشد؟

- (۱) به‌علت موقعیت قرارگیری قلب، کلیه چپ کمی پایین‌تر قرار می‌گیرد.
(۲) قاعده هرم‌های کلیه به سمت لگنچه و رأس آن‌ها به سمت ناحیه قشری است.
(۳) شبکه مویرگی دور لوله‌ای مستقیماً سیاهرگ کلیه را می‌سازد.
(۴) شبکه مویرگی اول یا همان کلافاک (گلوپول) در کیسول بومن کلیه مهره‌داران واقع شده است.

۵- در نخستین مرحله تشکیل ادرار چه تعداد از فرآیندهای زیر رخ می‌دهد؟

- (الف) هم مواد مفید مثل آمینواسید و هم مواد دفعی مثل اوره وارد گردیزه می‌شوند.
(ب) برای ورود مواد به گردیزه هیچ انتخاب دیگری به‌جز اندازه مواد، صورت نمی‌گیرد.
(ج) در نتیجه فشار خون، تمام خوناب از کلافاک خارج و به کیسول بومن وارد می‌شود.
(د) برخلاف وجود مویرگ‌های منفذدار در کلافاک، مولکول‌های بزرگ نمی‌توانند وارد کیسول بومن شوند.

- (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار

۶- یاخته‌های دیواره بیرونی کیسول بومن از نوع و یاخته‌های دیواره لوله پیچ خورده نزدیک از نوع است.

- (۱) سنگ‌فرشی استوانه‌ای - پوششی مکعبی (۲) پوششی مکعبی - پوششی استوانه‌ای
(۳) سنگ‌فرشی ساده - پوششی مکعبی (۴) پودوسیت - سنگ‌فرشی استوانه‌ای

۷- در ارتباط با فرآیندهای تشکیل ادرار کدام عبارت نادرست است؟

- (۱) پودوسیت‌ها در دیواره درونی کیسول بومن، اطراف مویرگ‌های کلافاک را احاطه کرده‌اند.
(۲) فرآیند بازجذب در بیشتر موارد به‌صورت فعال و با صرف انرژی صورت می‌گیرد.
(۳) بیشتر بودن قطر سرخرگ و ابران نسبت به سرخرگ آوران موجب افزایش فشار تراوشی در مویرگ‌های کلافاک شده است.
(۴) ریز پرزهای لوله پیچ خورده نزدیک موجب افزایش میزان بازجذب مواد در این ناحیه شده است.

۸- فراوان‌ترین ماده آلی موجود در ادرار چیست؟

- (۱) آب (۲) اوره (۳) کراتینین (۴) اوریک‌اسید

۹- کدام گزینه به‌درستی بیان شده است؟

- (۱) کلیه اندام لوبیایی شکل است که در طرفین ستون مهره‌ها و جلوی شکم قرار دارد.
(۲) مجموعه اعمالی که برای پایدار نگه داشتن وضعیت بیرونی جاندار انجام می‌شود هم‌ایستایی (هومئوستازی) نام دارد.
(۳) دنده‌ها کاملاً از کلیه‌ها محافظت می‌کنند و پرده شفافی به نام کیسول کلیه اطراف آن را پوشانده است.
(۴) هر کلیه از حدود یک میلیون گردیزه (نفرن) تشکیل شده است که فرآیند تشکیل ادرار در آن‌ها آغاز می‌شود.


۱۰- در ماهی رگ بیرون برنده خون از بطن

- (۱) سیاهرگی با خون روشن است (۲) سرخرگی با خون روشن است (۳) سرخرگی با خون تیره است (۴) سیاهرگی با خون تیره است

۱۱- بنداره (اسفنگتر) ابتدای میزراه و بنداره داخلی از نوع است.

- (۱) دو نوع است - همانند ماهیچه دیواره سرخرگ - صاف (۲) هنگام ورود ادرار باز می‌شود - برخلاف ماهیچه بنداره مخرج - مخطط
(۳) به‌صورت غیرارادی باز است - همانند بنداره خارجی - مخطط (۴) دو نوع است - برخلاف بنداره‌های دیگر - ارادی

۱۲- با توجه به شکل جای علامت‌های سوال نامگذاری درست را انتخاب کنید.



- ۱) الف) میزنای - ب) سرخرگ آوران - پ) کلیه
- ۲) الف) لگنچه - ب) سرخرگ کلیه - پ) کپسول کلیه
- ۳) الف) لگنچه - ب) سیاهرگ کلیه - پ) کپسول کلیه
- ۴) الف) میزنای - ب) سیاهرگ کلیه - پ) بخش قشری

۱۳- نمی‌توان گفت

- ۱) عامل حرکات کرمی شکل میزنای، انقباض ماهیچه دیواره آن است.
- ۲) بعد از ورود ادرار به مثانه دریچه حاصل از چین خوردگی مخاط مثانه باز می‌ماند.
- ۳) پیش راندن ادرار ناشی از حرکات کرمی شکل دیواره میزنای است.
- ۴) ادرار پس از ساخته شدن از طریق میزنای به مثانه می‌رسد.

۱۴- در ارتباط با فرآیند ترشح در کلیه‌های انسان، کدام عبارت نادرست است؟

- ۱) در دفع بعضی از سموم و داروها نقش دارد.
- ۲) مواد دفعی از مویرگ‌های دور لوله‌ای یا خود یاخته‌های گردیزه به درون گردیزه ترشح می‌شوند.
- ۳) در هنگام افزایش PH خون، کلیه‌ها یون هیدروژن را ترشح می‌کنند.
- ۴) در جهت مخالف بازجذب و در بیشتر موارد با حرف انرژی زیستی صورت می‌گیرد.

۱۵- نمی‌توان گفت در ملخ،

- ۱) اوریک‌اسید به همراه آب وارد لوله‌های مالپیگی می‌شود.
- ۲) قلب، مایع همولنف را به حفره‌های بدن پمپ می‌کند.
- ۳) در کنار یاخته‌ها، مویرگ‌ها به کمک آب میان بافتی تبادل مواد غذایی را انجام می‌دهند.
- ۴) اوریک‌اسید از طریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می‌شود.

۱۶- در ماهیان آب شور فشار اسمزی بدن

- ۱) بیشتر از آب دریاست و آب تمایل به خروج از بدن دارد.
- ۲) کمتر از آب دریاست و آب تمایل به خروج از بدن دارد.
- ۳) با آب دریا برابر است و یون‌ها از طریق یاخته‌های آبششی وارد می‌شوند.
- ۴) وجود ندارد و حجم زیادی از آب در ورود و خروج است.

۱۷- دستگاه عصبی مرکزی

- ۱) همانند - پیوسته - به آسانی انجام می‌شود.
- ۲) برخلاف - ناپیوسته - به سختی انجام می‌شود.
- ۳) همانند - ناپیوسته - قابل تنظیم نیست.
- ۴) برخلاف - پیوسته - به شدت تنظیم می‌شود.

۱۸- کدام گزینه تمام جاهای خالی را به ترتیب از راست به چپ به درستی تکمیل می‌کند؟

« قلب در پستانداران حفره‌ای با گردش خون در دوزیستان حفره‌ای و گردش خون و در ماهی‌ها قلب حفره‌ای و گردش خون است.»

- ۱) چهار - ساده - سه - مضاعف - دو - مضاعف
- ۲) چهار - مضاعف - سه - مضاعف - دو - ساده
- ۳) چهار - مضاعف - سه - مضاعف - دو - ساده
- ۴) سه - مضاعف - چهار - مضاعف - دو - ساده

۱۹- «گویچه‌های قرمز آسیب‌دیده و مرده در تخریب می‌شوند و با ترشح اریتروپویتین از سرعت تولید آن‌ها در مغز استخوان زیاد می‌شود.»

- ۱) کلیه‌ها و طحال - کلیه‌ها و کبد
- ۲) کبد و طحال - کلیه‌ها و کبد
- ۳) کلیه‌ها و کبد - کبد و طحال
- ۴) کبد و طحال - کلیه‌ها و طحال

۲۰- چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«بازوفیل

الف) برخلاف نوتروفیل، هسته دو قسمتی روی هم افتاده دارد.

ب) همانند ائوزینوفیل، از یاخته‌های بنیادی میلوئیدی منشأ می‌گیرد.

ج) برخلاف مونوسیت، سیتوپلاسمی با دانه‌های تیره دارد.

د) همانند لنفوسیت، هسته بیضی شکل یا گرد دارد.

- ۱) یک
- ۲) دو
- ۳) سه
- ۴) چهار

۲۱- کدام یک جز یاخته‌های سفید با منشأ میلوئیدی نیستند؟

- ۱) بازوفیل
- ۲) ائوزینوفیل
- ۳) گویچه سفید
- ۴) لنفوسیت

۲۲- در خونریزی‌های شدید

- ۱) برخلاف خونریزی محدود در محل دیواره رگ آسیب دیده درپوش ایجاد می‌شود.
- ۲) گرده‌ها (پلاکت‌ها) در تولید لخته خون نقش کمتری دارند.
- ۳) فیبرینوژن در ممانعت از خونریزی نقش اصلی را ایفا می‌کند.
- ۴) وجود ویتامین K و یون کلسیم در انجام انعقاد خون ضروری است.

۲۳- در یک فرد سالم مویرگ‌های لنفی روده

- ۱) محتویات خود را مستقیماً به کبد وارد می‌کنند.
- ۲) در انتقال چربی‌ها و پروتئین‌ها به خون نقش دارد.
- ۳) در مبارزه با بعضی از عوامل بیماری‌زا نقش دارند.
- ۴) در بازگرداندن لنف به دو سیاهرگ بزرگ بدن نقش دارند.

۲۴- برای تولید گویچه‌های قرمز، مستقیماً وجود کدام یک از موارد زیر ضروری است؟

- | | | | |
|------------------------------|----------|----------------------|----------------|
| الف) ویتامین B _{۱۲} | ب) آهن | ج) فاکتور داخلی معده | د) اسید فولیک |
| ۱) الف - ب | ۲) ب - د | ۳) الف - ب - د | ۴) الف - ب - ج |

۲۵- با توجه به شکل کدام موارد نادرست می‌باشد؟

- الف) محتویات «الف» به معده تخلیه می‌شود
 ب) بازجذب آب و یون‌ها از قسمت «ب» صورت می‌گیرد.

ج) لوله مالپیگی

- د) شکل، سامانه دفعی در برخی از حشرات و نرم‌تنان را نمایش می‌دهد.

- | | | | |
|------------|----------|------------|------------|
| ۱) الف و ج | ۲) ب و د | ۳) الف و د | ۴) الف و ب |
|------------|----------|------------|------------|

